

COURGETTE



DESCRIÇÃO

Planta herbácea, anual, com um sistema radicular muito alongado e que se estende por uma grande área de superfície. É uma planta rasteira que pode chegar aos 10 m de comprimento. Os caules de Courgette são normalmente herbáceos ou ligeiramente lenhificados, anguloso, estriados, ocos no centro, de aspecto áspero e sarmentoso. As folhas são pubescentes, lobuladas e em forma de coração. As flores são unissexuais, grandes, de corola amarela, surgindo solitárias nas axilas das folhas. Os frutos da Courgette são oblongos, cilíndricos, de cor verde com casca lisa e dura. As sementes são obtusas, achatadas, lisas, brancas a acastanhadas.

SEMENTEIRA

No local definitivo entre Abril-Junho ou em estufa ou estufim entre Fevereiro-Março.

CRESCIMENTO

Rápido, Médio.

TRANSPLANTAÇÃO

Entre Março-Julho com raiz protegida, pois são sensíveis à transplantação. Espaçamento de 80 cm entre linhas e 100 cm na linha ou entre plantas.

LUZ

Sol, meia-sombra. As Courgettes são exigentes em intensidade luminosa.

SOLOS

Bem drenados, ricos em matéria orgânica. O pH do solo deve situar-se entre 5,6-6,8. São sensíveis à salinidade.

TEMPERATURA

Plantas megatérmicas, sensíveis às geadas. Temperatura ideal entre 20-25 C°.

REGA

Regular. Não regar em exceso, manter humidade baixa e local bem arejado. Evitar molhar as folhas.

ADUBAÇÃO

Cultura sensível a carências de ferro e de molibdénio. Aplicar matéria orgânica bem decomposta um mês antes da plantação. Aplicar adubo completo na altura da plantação e 4-5 semanas depois.

FLORAÇÃO

Primavera/Verão.

PRAGAS E DOENÇAS

ácaros, mosca branca, afídeos, nóctuas, tripses. Oídio, Míldio, podridão cinzenta, Antracnose, Septoriose, murchidão das plântulas, Fusariose.

MULTIPLICAÇÃO

Semente.

COLHEITA

Abril-Outubro, 50-60 dias após a plantação. Colher os frutos de Courgette quando atingem tamanho desejado. Escolha os frutos firmes, com a casca de cor brilhante, sem partes escuras ou amolecidas.

