

# COUVE

## Repolho - Coração de boi



### DESCRIÇÃO

Planta herbácea, bienal, com sistema radicular apurado e superficial, com caule curto durante a fase vegetativa. As folhas das couves repolho são dispostas em roseta, formando depois um repolho, são grossas, de cor verde-escuro a glabras, algumas com a superfície do limbo enrugada mas normalmente lisas, são simples, alternas e inteiras. Estas couves formam um repolho terminal, formado pela sobreposição de folhas da gema terminal e podem ser de várias formas, tamanhos e cores. As flores são perfeitas dispostas numa inflorescência que é um rácimo. O fruto é uma síliqua.

### SEMENTEIRA

Em geral, as sementes de Couves Repolho semeiam-se de preferência em alfofre (de onde se transplantam mais tarde) desde o início da Primavera até meados do Outono. Em Portugal e todo o Hemisfério Norte nos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro).

### CRESCIMENTO

Médio

### TRANSPLANTAÇÃO

Quando transplantadas, devem ficar distanciadas umas das outras 60 a 80 cm. e nunca se devem cortar as folhas antes dos repolhos estarem fechados.

### TEMPERATURA

Cultura microtétrica, de estação fria. São moderadamente tolerantes às geadas. Temperaturas ideais situam-se entre os 15 Cº e os 20 Cº.

### HUMIDADE

Preferem climas com humidade relativa elevada.

### SOLOS

Prefiram solos frescos, de textura média ou argilosa, bem drenados e abundantemente estrumados.

### REGA

Requerem regas abundantes durante o Verão.

### ADUBAÇÃO

Adubar bem o solo antes da plantação com composto orgânico bem compostado. Aplicar adubo para hortícolas 1 a 2 vezes durante a fase de desenvolvimento.

### PRAGAS E DOENÇAS

Afídeos, alfinete, áltica, falsa potra, lagartas, mosca da couve, mosca branca da couve, nóctuas, traça da couve, tripes, nemátodes, míldio das crucíferas, pé negro, alternariose, podridão cinzenta, ferrugem branca, potra.

### MULTIPLICAÇÃO

Semente

